

ਹੈ।

ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ:

- ਕੰਨ ਕੁਤਰ ਕੇ (1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ (3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
- ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਹ ਖੁਰ ਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਓ।

ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

- ਸੂਰੀਆਂ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਛੁੱਡਾਉਣ ਤੋਂ 4-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਆਣ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾ:

- 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਕੋਲ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
- ਜਵਾਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 200-250 ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੱਭਣ ਨਿਕਲ ਆਉਣ।
- ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੱਭਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸੂਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੁੱਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
- ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਬੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਮੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਿਆ ਹੋਵਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਰ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਈੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,

ਲੁਧਿਆਣਾ-141004

ਫੋਨ : 0161-2414005, 2414026

ਸੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

REPRODUCTIVE MANAGEMENT OF SOW



ਡਾ. ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕਸਰੀਜਾ

ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ

ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ



FFP FOLDER - 14°

ACKNOWLEDGMENT

We are highly thankful to Farmer FIRST Programme, ICAR, New Delhi for providing financial assistance to publish this folder for the benefit of farmers.

ਗੁਰੂ ਅੰਗਰ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਈੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਲੁਧਿਆਣਾ-141004

ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਡੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਫੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਸ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੂਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

- ਸੂਰੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ (ਵਜਨ 85-90 ਕਿਲੋ) ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹੋਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਹਾ ਚੱਕਰ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 112-116 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੂਰੀ ਇੱਕ ਸੂਏ ਵਿੱਚ 6-12 ਬੱਚੇ ਆਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ:

- ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਗਣਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ।
- ਸੂਰੀ ਦੀ ਸੂਅ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੂਅ ਉੱਤੇ ਸੋਜ।
- ਦੂਜੀ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਨੱਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਰੀ ਉਪਰ ਚੱਝਣਾ।
- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਣੀ ਤੇ ਬੇ-ਆਰਾਮੀ।
- ਸੂਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕੂਮਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਰਜਣਾ ਜਾਂ ਦਹਾੜਣਾ।
- ਜੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ:

- ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ (ਹੋਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੰਡ ਖਵਾਉ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
- ਗਰਭ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਚੜਣ ਨਾਲ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਓ।

ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

- ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰ 85-95 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ।



- 15-20 ਸੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਰਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਭਾਲ:

- ਸੂਣ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਆ ਉੱਤੇ ਸੋਜ, ਬਣਾ ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਬੈਚੇਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੂਣ ਤੋਂ 1-2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਭਣ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਘਰ (Farrowing Pen) ਵਿੱਚ ਰਖੋ।
- ਗੱਭਣ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:

- ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਣ ਲਈ 3-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੂਣ ਵਿਚਕਾਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ:

- ਮੰਹ ਅਤੇ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੇਸਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।
- ਠੰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ, 2 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਤਹਿ ਵਾਲੀ ਕੁਤਰੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਸ ਰੋਗ (ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰੀ ਦੇ ਚੱਡੇ ਤੇ ਲੋਹ ($FeSO_4$) ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਲੇਪ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਹ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ।
- ਨਵੀਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾ (ਗਾਰਡ ਰੇਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ