

- ਜੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਟੋਆ ਪੁਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿਉ ।
- ਜੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ।
- ਜੇਰ ਤੇ ਤੂਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉ ।

#### ਸੂਤਕੀ ਬੁਖਾਰ (Milk Fever):

- ਕਾਰਣ- ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ।
- ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
- ਸੂਤਕੀ ਬੁਖਾਰ ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ/ਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਉ ।
- ਸੂਤਕੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾੜ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮੜੀ 'ਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ।

#### ਸੂਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਣ:

- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਣਾ ।
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ।
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ।
- ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ।
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ।
- ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ।
- ਸੂਣ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ।
- ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਨੂੰ ½ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

#### ਜੇਰ ਨਾ ਪੈਣਾ:

- ਜੇਰ 12 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
- ਜੇਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸੋਜ, ਬੱਚਾ ਸੁਟਣਾ ਆਦਿ ।
- ਜੇਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
**ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ**  
**ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,**  
**ਲੁਧਿਆਣਾ-141004**  
**ਫੋਨ : 0161-2414005, 2414026**

# ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

## REPRODUCTIVE PROBLEMS OF GOAT



ਡਾ. ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਘ  
 ਡਾ. ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  
 ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕਸਰੀਜਾ  
 ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  
 ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ  
 ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ

**FFP FOLDER - 13**

**ACKNOWLEDGMENT**  
 We are highly thankful to Farmer FIRST Programme, ICAR, New Delhi for providing financial assistance to publish this folder for the benefit of farmers.

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,  
 ਲੁਧਿਆਣਾ-141004



ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਹਰ ਸੂਐ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸੂਐ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਐ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।

- ਬੱਕਰੀਆਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹੇਠਾ ਚੱਕਰ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹੇਠੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਅੰਡੇ ਇਕ ਰਸਾਇਣ (ESTROGEN) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

#### ਹੇਠੇ ਦੇ ਲੱਛਣ:

- ਸੂਐ ਦਾ ਸੁਜਣਾ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ
- ਮਿਆਕਣਾ
- ਸਾਥੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਪਰ ਚੜਨਾ
- ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦੇਣਾ
- ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ
- ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਹੇਠੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖੋ।
- ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ - 18-19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਹੇਠੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।

#### ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ:

- 1 ਬੱਕਰਾ 25-30 ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਲਗਭਗ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੇਠੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੌਂਦ ਨਾਲ ਜੌਰ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾ ਜਾ ਹੇਠੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਲੱਪਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਉ।
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ (1-2% ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ)।
- ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉ।

#### ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:

- ਹੇਠੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 24-30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹੇਠੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



#### ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਭਣ ਨਾ ਰਹਿਣਾ:

- ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਲਾਗ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ।
- ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

#### ਮਿਥਿਆ ਗਰਭ (Pseudopregnancy):

- ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਭਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਢਿੱਡੋ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

#### ਤੂਅ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ:

- ਤੂਅ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੂਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਅਛੂਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ- ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ (Brucellosis)।
- ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਰੂਸੈਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਕਰੀ ਸੂਐ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਤੂਅ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਤੂਅ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਢ ਕਰ ਦਿਉ।